

## **INFORMATIONS MÉDICALES AVANT LA RÉALISATION D'EXTRACTIONS DENTAIRES de dents cariées, enclavées ou en mal position**

Madame, Monsieur,

Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Votre chirurgien est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

N'oubliez pas de dire à votre chirurgien les traitements que vous prenez régulièrement, et en particulier aspirine, anticoagulants... N'oubliez pas de signaler si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier médicamenteuses. Enfin n'oubliez pas d'apporter, lors de l'hospitalisation, les documents médicaux en votre possession : prises de sang, examens radiologiques notamment.

### **BUT DE L'INTERVENTION**

Cette intervention permet de procéder à l'extraction de dents cariées, ou encore de certaines dents enclavées ou en malposition. Celle-ci est pratiquée sous anesthésie générale car elle est particulièrement délicate ou difficile à réaliser sous anesthésie locale au fauteuil par votre chirurgien-dentiste.

### **RÉALISATION DE L'INTERVENTION**

L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie préopératoire est indispensable. Il est de la compétence du médecin-anesthésiste-réanimateur de répondre à vos questions relatives à sa spécialité. La durée de l'intervention est variable et fonction des difficultés chirurgicales. La durée de l'hospitalisation et les soins post-opératoires vous seront précisés par votre chirurgien.

### **RISQUES IMMÉDIATS**

Au décours immédiat de l'intervention, les complications hémorragiques sont exceptionnelles. Les douleurs sont relativement peu importantes. Par contre, un œdème des joues peut survenir surtout en cas d'extraction de dents incluses.

### **RISQUES SECONDAIRES**

Les troubles de la mastication surviennent lors des premiers jours et peuvent durer jusqu'à une semaine. L'alvéolite est une réaction inflammatoire secondaire survenant en général au bout d'une quinzaine de jours. Elle nécessite parfois la reprise d'un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Rarement, elle peut évoluer vers un abcès avec gonflement de la joue, l'évacuation de cet abcès (au fauteuil) et la reprise également d'un traitement antibiotique. L'extraction des dents inférieures peut entraîner deux sortes de complications : un traumatisme du nerf dentaire inférieur, ce qui est responsable d'une hypoesthésie (diminution la sensibilité) de l'hémi-lèvre inférieure correspondante ; une atteinte du nerf lingual entraînant une hypoesthésie de l'hémi-langue. Ces complications sont exceptionnelles.

### **COMPLICATIONS GRAVES ET/OU EXCEPTIONNELLES**

La fracture de la mandibule liée à une fragilité de l'os soit spontanée soit par fraisage excessif du fait de la difficulté de l'extraction peut survenir de façon très exceptionnelle. Elle peut être de découverte secondaire et nécessite alors une intervention de réduction et de contention mandibulaire. L'irruption dans le sinus maxillaire survient pendant l'extraction (dent supérieure dans la majorité des cas) et l'évacuation de la dent est réalisée pendant le temps opératoire.

**Fait en double exemplaire  
Informations lues, approuvées et comprises**

**DOCUMENT A APPORTER LORS DE  
LA CONSULTATION ANESTHÉSIE**

Le :  Signature (du patient majeur ou des 2 parents)